

**ETUDE DE L'ASSOCIATION
DE SIPF MELILOT-CASSIS-
MARRON D'INDE CONTRE
UNE FRACTION FLAVONOIQUE
MICRONISEE (DAFLON^R 500)
DANS LE TRAITEMENT DES
TROUBLES DE L'INSUFFISANCE
VEINEUSE FONCTIONNELLE
ET ORGANIQUE DES
MEMBRES INFERIEURS**

Professeur AGACHE - (CHU BESANCON)

| | |
|-------------------------|--|
| TYPE DE L'ETUDE | Etude contrôlée, randomisée contre produit de référence (DAFLON [®] 500) |
| FORME GALENIQUE | <ul style="list-style-type: none"> - Suspensions Intégrales de Plantes fraîches Mélilot-Cassis-Marron d'Inde - DAFLON[®] 500 comprimés |
| CRITERES D'INCLUSION | <ul style="list-style-type: none"> - insuffisance veineuse fonctionnelle (absence d'anomalie décelable des troncs veineux) - insuffisance veineuse organique (le plus souvent liée à une maladie variqueuse ou à une atteinte post phlébitique) |
| NOMBRE DE SUJETS | 108 |
| POSOLOGIE | <ul style="list-style-type: none"> - SIPF Mélilot-Marron d'Inde-Cassis : 2 cuillères à café matin et soir - DAFLON 500 mg : 1 comprimé midi et soir |
| DUREE DU TRAITEMENT | 2 mois |
| PARAMETRES ETUDIES | <ul style="list-style-type: none"> - <u>signes fonctionnels</u> : gêne, pesanteur ou lourdeur, douleur spontanée, fatigabilité, crampes nocturnes, paresthésies, brûlures et prurit - <u>signes physiques</u> : douleur provoquée, rougeur ou cyanose, chaleur locale, oedème induration des téguments, diamètre des chevilles et des mollets - tolérance - efficacité du traitement jugée par le malade et le médecin |
| CRITERES D'APPRECIATION | <ul style="list-style-type: none"> - appréciation cotée de 0 à 5 selon l'intensité des signes : absents, faibles, moyens importants, sévères ou invalidants |

APPRECIATION GLOBALE DE L'EFFICACITE

1) Par le patient

A chaque visite de contrôle, le malade a été interrogé sur l'efficacité du traitement (0 = nulle à 4 = excellente).

L'efficacité des 2 traitements a été jugée "appréciable" après 30 jours d'administration.

UNE AMELIORATION SIGNIFICATIVE DE CE CRITERE APPARAÎT A J60 POUR LE GROUPE SIPF CASSIS-MELILOT-MARRON D'INDE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DU GROUPE DAFLON 500.

2) Par le médecin

A chaque visite de contrôle, le médecin donnait son appréciation sur l'efficacité globale du traitement (signes fonctionnels et physiques).

L'ASSOCIATION SIPF MELILOT-CASSIS-MARRON D'INDE MONTRE UNE EFFICACITE THERAPEUTIQUE LEGEREMENT SUPERIEURE AU DAFLON 500 TANT SUR LES SIGNES FONCTIONNELS QUE SUR LES SINGES PHYSIQUES.

TOLERANCE

Le patient et le médecin apprécient la tolérance des traitements à chaque visite (acceptabilité nulle = 0, acceptabilité excellente = 4).

La tolérance est jugée bonne et comparable pour les 2 traitements tant par les patients (moyenne = 3) que par les médecins (moyenne = 3,3).

CONCLUSION

Dans le traitement de l'insuffisance veineuse fonctionnelle ou organique, l'association SIPF Melilot-Cassis-Marron d'Inde et le DAFLON 500 se revelent efficaces (sur tous les symptomes etudies) et bien toleres.

Cependant, l'association SIPT Melilot-Cassis-Marron d'Inde montre une efficacite therapeutique superieure au DAFLON 500 sur les symptomes suivants :

- > prurit
- > chaleur locale
- > rougeur locale

A J30, les patients jugent les 2 traitement "appréciables" quant à leur efficacité. Entre J30 et J60, les patients notent une amélioration significative de ce critère dans le groupe SIPF ce qui n'est pas le cas du groupe DAFLON 500.

Les medecins estiment quant à eux que l'efficacité therapeutique de l'association SIPF Melilot-Cassis-Marron d'Inde est légèrement superieure à celle du DAFLON 500 tant sur les signes fonctionnels que sur les signes physiques.